



ООО «КРОНА»
Почтовый адрес: 03118, Украина, Киев, 116, ул. Козацкая, оф. 202
Юридический адрес: 07024, Украина, Киевская обл. Полесский р-н, с. Буда-Радынська, ул. Гагаріна, д. 38 к. А
Код ЕГРПОУ 30846143
Тел/факс +38 044 374 43 43 e-mail: info@bast.land www.bast.land

Техническая спецификация

Наименование продукции	BAST Zn OxiChelate (БАСТ Цинк Оксихелат)
Описание	Комбинированное цинковое удобрение содержит оксидную и хелатную форму цинка. Применяется для листовой подкормки сельскохозяйственных культур.
Внешний вид	белая жидкость (сuspension)
Растворимость в воде	хорошо смешивается с водой, содержит нерастворимые компоненты (оксид цинка)
pH	7,5-9,5
Плотность	1,70 ±0,05 г/см ³
Состав	700 г/л - цинк (Zn) (670 г/л – цинк в оксидной форме (ZnO) + 30 г/л – цинк в хелатной форме (EDTA-ZnNa ₂))
Фасовка	1 л, 5 л, 10 л



ООО «КРОНА»
Почтовый адрес: 03118, Украина, Киев, 116, ул. Козацкая, оф. 202
Юридический адрес: 07024, Украина, Киевская обл. Полесский р-н, с. Буда-Радынська, ул. Гагарина, д. 38 к. А
Код ЕГРПОУ 30846143
Тел/факс +38 044 374 43 43 e-mail: info@bast.land www.bast.land

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КУЛЬТУРА	BAST Zn OxiChelate (БАСТ Цинк Оксихелат) Листовая подкормка
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ	0,5-1 л/га от появления 2 листа до образования 2 узла. При необходимости повторить через 10-14 дней. Расход воды: 200-300 л/га.
ТОМАТЫ, ПЕРЕЦ	0,3 – 1,0 л/га в фазу 4-6 листьев. При необходимости повторить с интервалом 10-14 дней. Расход воды: 200-300 л/га
КУКУРУЗА	0,4-1 л/га в фазе от 3 до 8 листьев. Расход воды: 200-300 л/га. Рекомендуется подкормку дополнить удобрением BAST Bor Energy 1-1,5 л/га. Расход воды: 200-300 л/га.
ПОДСОЛНЕЧНИК	0,2-1 л/га в фазе 2 пары листьев. При необходимости повторить через 10-14 дней. Расход воды: 200-300 л/га.
БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ	0,5-1 л/га. в фазе 5-7 листьев. При необходимости повторить через 10-14 дней. Расход воды: 200-300 л/га.
РАПС	0,5-1 л/га в фазу бутонизации. При необходимости повторить через 10-14 дней. Расход воды: 200-300 л/га
КАРТОПЛЯ	0,5-1 л/га в фазу 4-6 листьев. При необходимости повторить с интервалом 10-14 дней. Расход воды: 300-400 л/га
КАПУСТА	0,5-1 л/га в фазу 4-9 листьев. Расход воды: 300-400 л/га
САХАРНАЯ СВЕКЛА	0,3-1,0 л/га в фазу 4-6 листьев, при необходимости повторить через 10-14 дней. Расход воды: 300-400 л/га.
ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ СЕМЕЧКОВЫЕ	0,5-1 л/га весной в фазу зеленой почки и в конце цветения. Вторая подкормка после сбора урожая – 0,3-0,5 л/га. Расход воды: 500-1000 л/га
МАЛИНА	0,2-0,5 л/га в фазу зеленой почки. Расход воды: 300-500 л/га
ЗЕМЛЯНИКА, КЛУБНИКА	0,3-0,5 л/га в фазу зеленой почки, повторная обработка в фазу белой почки и после сбора урожая. Расход воды: 300-500 л/га.