

Технічна специфікація

Найменування продукції	BAST MolyBor Energy (БАСТ МоліБор Енерджі)
Опис	Рідке концентроване борне добриво, містить також азот та молібден. Застосовується для листового підживлення сільськогосподарських культур.
Зовнішній вигляд	жовтувата рідина
Розчинність у воді	100%
pH	2.5-3.5
Густина	1.27±0.05 г/см ³
Склад	35 г/л – бор (В) 50 г/л – азот (N) 5 г/л – молібден (Mo) 25 г/л – L-аміно кислоти 10 г/л – органічні кислоти
Фасування	1 л, 5 л, 10 л

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

КУЛЬТУРА	BAST MolyBor Energy (БАСТ МоліБор Енерджі) Позакореневе підживлення
БОБОВІ КУЛЬТУРИ	1-2 л/га у фазі 3-5 трійчастих листків до бутонізації - початку цвітіння. При необхідності повторити обробку через 10-14 днів. Витрата води: 200-300 л/га.
ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ	1-2 підживлення з нормою 1-2 л/га з інтервалом 10-14 днів за період вегетації. Витрата води: 200-300 л/га.
РІПАК	1-2 л/га у фазі 4-10 листків восени, за потреби повторити через 10-14 днів. Навесні в фазу стеблуння. При необхідності повторити обробку з інтервалом 10-14 днів і до початку цвітіння. Витрата води: 200-300 л/га.
БУРЯК ЦУКРОВИЙ	2-3 л/га. Перше підживлення проводять у фазу 4-6 листків. Повторюють в фазі змикання листя у рядках та змикання листя у міжряддях. Витрата води: 300-400 л/га.
ІНШІ КУЛЬТУРИ	1-2 л/га за прояви візуальних ознак (або за результатами функціональної діагностики) дефіциту бору або молібдену. При необхідності повторити підживлення через 10-14 днів. Витрата води: 200-300 л/га.