

Мікродобриво

БАСТ NPK Плюс 45-200-65

Рідке багатокомпонентне NPK добриво з збільшеним вмістом фосфору. Містить органічні та вільні L-амінокислоти. Призначене для кореневого та позакореневого підживлення сільськогосподарських культур.

Склад:

Азот (N) – 45 г/л	Сірка (SO ₃) – 10 г/л
Фосфор (P ₂ O ₅) – 200 г/л	Цинк (Zn) – 5,0 г/л
Калій (K ₂ O) – 65 г/л	Бор (B) – 2,7 г/л
L-аміно кислоти – 20 г/л	Мідь (Cu) – 1,0 г/л
органічні кислоти – 50 г/л	Марганець (Mn) – 0,6 г/л
	Залізо (Fe) – 0,3 г/л
	Молібден (Mo) – 0,1 г/л

- містить зволожувач, який подовжує висихання розчину добрива на поверхні, що дуже важливо в умовах спекотного клімату
- азот в амідній формі та ортофосфатна форма фосфору легко засвоюються рослиною
- органічні та вільні L-амінокислоти у складі продукту покращують засвоєння добрива
- мікроелементи в добриві знаходяться в хелатній формі, що сприяє швидкому їх поглинанню рослинами
- не містить хлоридів та баластних речовин



Контакти:



+38044 374 50 43



info@bast.land
www.bast.land



м. Київ, вул. Козацька 116,
офіс 202



www.bast.land

BAST
ФОРМУЛА ВАШОГО ВРОЖАЮ





РЕЗУЛЬТАТ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОДОБРИВА БАСТ NPK Плюс 45-200-65

- сприяє розвитку потужної кореневої системи особливо на початкових етапах розвитку рослини
- стимулює розвиток генеративних органів рослини
- сприяє підвищенню концентрації хлорофілу, покращуючи умови проходження процесу фотосинтезу
- збільшує інтенсивність синтезу сахарози, крохмалю, жирів
- покращує засвоєння елементів живлення з ґрунту
- стимулює метаболізм та підвищує стресостійкість рослин
- оптимізує водний режим рослин в умовах посухи
- підвищує врожайність та покращує якість врожаю

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ



ЗЕРНОВІ

Позакореневе підживлення: для озимих культур - восени 2-5 л/га в фазі кушення, навесні на початку вегетації 2-5 л/га. За потреби повторити з інтервалом 10-14 днів. Витрата води: 200-300 л/га. Кореневе підживлення: при сівбі 10-60 л/га, підживлення в міжряддя: 30-50 л/га.



ОВОЧЕВІ

Позакореневе підживлення: 2-5 л/га через 7 днів після висадки розсади. За потреби повторити з інтервалом 10-14 днів. Витрата води: 200-300 л/га. Кореневе підживлення: при сівбі 10-60 л/га, підживлення в міжряддя: 30-50 л/га.



КУКУРУДЗА

Позакореневе підживлення: 2-5 л/га в фазі 3-5 листків. При необхідності повторити підживлення з інтервалом 14-20 днів. Витрата води: 200-300 л/га. Кореневе підживлення: при сівбі 10-60 л/га, підживлення в міжряддя: 30-50 л/га.



СОНЯШНИК

Позакореневе підживлення: 2-5 л/га у фазі 4-6 листків. За потреби повторити з інтервалом 10-14 днів. Витрата води: 200-300 л/га. Кореневе підживлення: при сівбі 10-60 л/га, підживлення в міжряддя: 30-50 л/га.



ГОРОХ, КВАСОЛЯ, СОЯ

Позакореневе підживлення: 2-5 л/га з фази 3-5 трійчаних листків до цвітіння. За потреби повторити з інтервалом 10-14 днів. Витрата води: 200-300 л/га. Кореневе підживлення: при сівбі 10-60 л/га, підживлення в міжряддя: 30-50 л/га.



РІПАК

Позакореневе підживлення: 2-5 л/га восени з 4-х справжніх листків; навесні: з початку вегетації. За потреби повторити через 10-14 днів. Витрата води: 200-300 л/га. Кореневе підживлення: при сівбі 10-60 л/га, підживлення в міжряддя: 30-50 л/га.



ПЛОДОВІ ДЕРЕВА. ВИНОГРАД

Позакореневе підживлення: 3-6 л/га в фазу зеленої бруньки, бутонізації-початок цвітіння та в фазу формування та росту плодів. Витрата води: 500-1000 л/га. Кореневе підживлення: 5 л/1000 літрів води для поливної суміші.



БУРЯК ЦУКРОВИЙ

Позакореневе підживлення: 2-5 л/га. Перше підживлення у фазу 4-6 листків. За потреби повторити в фазі змикання листя у рядках та змикання листя у міжряддях. Витрата води: 200-300 л/га. Кореневе підживлення: при сівбі 10-60 л/га, підживлення в міжряддя: 30-50 л/га.



ВСІ КУЛЬТУРИ. ПОЛИВ (ФЕРТИГАЦІЯ)

5 л/1000 літрів води. Загальна витрата добрива: 50-100 л/га за період вегетації.

ФУНКЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ В РОСЛИНІ

Фосфор забезпечує енергією всі процеси в рослині, а співвідношення азоту та калію в живленні рослин, як дві протизаваги, баланс та співвідношення яких визначає спрямованість обмінних та синтетичних процесів, а дисбаланс призводить до суттєвого зниження кількісних та якісних показників урожаю.

- **АЗОТ.** Відповідає за білковий обмін та є елементом утворення органічної речовини. Регулює зростання вегетативної маси, визначає рівень врожайності.
- **ФОСФОР.** Головне призначення фосфору – прискорення обмінних процесів у клітинах, і, як наслідок – швидкий перехід від цвітіння до плодоношення, краще визрівання насіння та плодів, підвищення опору до захворювань, прискорення формування корневих систем рослин.
- **КАЛІЙ.** Відповідає за вуглеводний обмін. Посилює накопичення моносахаридів у плодівих та овочевих культур, підвищує вміст сахарози у коренеплодах, крохмалю в картоплі, потовщує стінки клітин соломини злакових культур та підвищує стійкість хлібів до вилигання. Підвищує холодо- та морозостійкість рослин, допомагає рослинам краще переносити короточасні посухи.
- **МІКРОЕЛЕМЕНТИ.** Покращують засвоєння макроелементів, стимулюють ріст та розвиток точок росту, стимулюють метаболізм та покращують стресостійкість рослин.

