

## Технічна специфікація

| Найменування продукції | BAST NPK Plus 45-200-65<br>(БАСТ NPK Плюс 45-200-65)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Опис                   | Рідке багатоконпонентне NPK добриво з збільшеним вмістом фосфору. Містить органічні та вільні L-амінокислоти. Призначене для позакореневого та кореневого підживлення сільськогосподарських культур.                                                                                                                                                                                  |
| Зовнішній вигляд       | бірюзова рідина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Розчинність у воді     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| рН                     | 5.5-7.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Густина                | 1.33±0.05 г/см <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Склад                  | 45 г/л - азот (N)<br>200 г/л - фосфор (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )<br>65 г/л - калій (K <sub>2</sub> O)<br>50 г/л – органічні кислоти<br>20 г/л - L-аміно кислоти<br>10 г/л – сірка (SO <sub>3</sub> )<br>5.0 г/л - цинк (Zn)*<br>2.7 г/л - бор (B)<br>1.0 г/л - мідь (Cu)*<br>0.6 г/л - марганець (Mn)*<br>0.3 г/л – залізо (Fe)*<br>0.1 г/л - молібден (Mo)<br>*хелатовані EDTA |

## Фасування

1 л, 5 л, 10 л

## РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

| КУЛЬТУРА BAST NPK Plus 45-200-65<br>(БАСТ NPK Плюс 45-200-65) |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ</b>                                       | Позакореневе підживлення: Для озимих культур - восени 2-5 л/га в фазі кущення, навесні на початку вегетації 2-5 л/га. За потреби повторити з інтервалом 10-14 днів. Витрата води: 200-300 л/га.<br>Кореневе підживлення: при сівбі 10-60 л/га, підживлення в міжряддя – 30-50 л/га |
| <b>ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ</b>                                       | Позакореневе підживлення: 2-5 л/га через 7 днів після висадки розсади. За потреби повторити з інтервалом 10-14 днів. Витрата води: 200-300 л/га.<br>Кореневе підживлення: при сівбі 10-60 л/га, підживлення в міжряддя – 30-50 л/га                                                |
| <b>КУКУРУДЗА</b>                                              | Позакореневе підживлення: 2-5 л/га в фазі 3-5 листків. При необхідності повторити підживлення з інтервалом 14-20 днів. Витрата води: 200-300 л/га.<br>Кореневе підживлення: при сівбі 10-60 л/га, підживлення в міжряддя – 30-50 л/га                                              |
| <b>СОНЯШНИК</b>                                               | Позакореневе підживлення: 2-5 л/га у фазі 4-6 листків. За потреби повторити з інтервалом 10-14 днів. Витрата води: 200-300 л/га.<br>Кореневе підживлення: при сівбі 10-60 л/га, підживлення в міжряддя – 30-50 л/га                                                                |
| <b>БОБОВІ КУЛЬТУРИ</b>                                        | Позакореневе підживлення: 2-5 л/га з фази 3-5 трійчастих листка до цвітіння. За потреби повторити з інтервалом 10-14 днів. Витрата води: 200-300 л/га.<br>Кореневе підживлення: при сівбі 10-60 л/га, підживлення в міжряддя – 30-50 л/га                                          |
| <b>РІПАК</b>                                                  | Позакореневе підживлення: 2-5 л/га восени з 4-х справжніх листків; навесні: з початку вегетації. За потреби повторити через 10 – 14 днів. Витрата води: 200-300 л/га.<br>Кореневе підживлення: при сівбі 10-60 л/га, підживлення в міжряддя – 30-50 л/га                           |
| <b>ПЛОДОВІ ДЕРЕВА, ВИНОГРАД</b>                               | Позакореневе підживлення: 3-6 л/га в фазу зеленої бруньки, бутонізації-початок цвітіння та в фазу формування та росту плодів. Витрата води – 500-1000 л/га<br>Кореневе підживлення: 5 л/1000 літрів води для поливної суміші                                                       |
| <b>БУРЯК ЦУКРОВИЙ</b>                                         | Позакореневе підживлення: 2-5 л/га. Перше підживлення - у фазу 4-6 листків. За потреби повторити в фази змикання листя у рядках та змикання листя у міжряддях. Витрата води: 200-300 л/га.<br>Кореневе підживлення: при сівбі 10-60 л/га, підживлення в міжряддя – 30-50 л/га      |

## Полив (фертигація)

|                     |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ВСІ КУЛЬТУРИ</b> | 5 л/1000 літрів води. Загальна витрата добрива - 50-100 л/га за період вегетації. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|